

# Les Événements de l'Année en Médecine 2009

## DIABÉTOLOGIE 2009

PROGRAMME

LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE  
RÉUNION ANNUELLE

9 Janvier 2009

Paris - Palais des Congrès

Président du Comité Scientifique  
Pr. Gérard SLAMA

### COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ORATEURS

André GRIMALDI

Etienne LARGER

José SAHEL

Bruno GUERCI

Jocelyne MBEMBA

Gérard SLAMA

Claudine GUYOT-ARGENTON

Louis MONNIER

Agnès SOLA

Laurence KESSLER

Gérard REACH

Claude VAISLIC

Michel KREMPF

Paul VALENSI

VENDREDI 9 JANVIER 2009

**DIABÉTOLOGIE** 2009  
LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE

## ACTUALITÉS EN DIABÉTOLOGIE PROGRAMME

### MATIN

#### CONTROVERSES ET DÉBATS

##### Nouveaux mécanismes, nouvelles molécules

9h00 - 9h25	Les antiendocannabinoïdes - Résultats actuels .....	Michel KREMPF
9h25 - 9h50	Les incrétines - Bases physiologiques .....	Bruno GUERCI
	Les analogues du GLP1 - Expérience clinique.....	Bruno GUERCI
9h50 - 10h10	Les inhibiteurs des DPPIV - Expérience clinique .....	Etienne LARGER
10h10 - 10h25	Les nouvelles molécules ont-elles un avenir qui satisfasse les exigences de sécurité et le principe de précaution actuels ?.....	Gérard SLAMA

10h30 - 11h00 Pause

#### EST-IL POSSIBLE, LÉGITIME, D'AVOIR UN OBJECTIF GLYCÉMIQUE AU-DESSOUS DE 7 % ? DE 6,5 % ? DE 6 % ? CHEZ DES DIABÉTIQUES DE TYPE 2

11h00 - 11h15	Résultats des études interventionnelles récentes.....	Agnès SOLA
11h15 - 11h25	Niveau de preuves faible.....	André GRIMALDI
11h25 - 11h35	Oui, niveau de preuves suffisant .....	Laurence KESSLER
11h35 - 11h50	Discussion générale	

#### COMMENT JE TRAITE ET PRENDS EN CHARGE ?

11h50 - 12h10	Place du chirurgien cardiaque dans le traitement de l'insuffisance coronarienne du diabétique .....	Claude VAISLIC
12h10 - 14h00	Déjeuner	

### APRÈS-MIDI

#### LES CHOIX DE STRATÉGIE

14h00 - 14h25	Jusqu'où faut-il descendre l'HbA1c chez le diabétique vasculaire ?.....	Paul VALENSI
14h25 - 14h50	Glycémie à jeun et postprandiale, quelle est la meilleure cible ? L'exemple des études APOLLO et 4-T .....	Louis MONNIER
14h50 - 15h15	Une polychimiothérapie d'emblée reste-t-elle une « position extrémiste » ? .....	Gérard SLAMA
15h15 - 15h40	La variabilité glycémique, le problème le plus important du diabète de type 1.....	Gérard REACH

15h40 - 16h00 Pause

#### COMMENT JE TRAITE ET PRENDS EN CHARGE ?

16h00 - 16h20	Une prothèse rétinienne est-elle envisageable ? .....	José SAHEL
16h20 - 16h40	Du bon usage des injections intravitréennes dans un œil ....	Claudine GUYOT-ARGENTON
16h40 - 17h00	Une plaie du pied chez un diabétique.....	Jocelyne MBEMBA

Pour les patients **diabétiques de type 2**, en association à la metformine, lorsque celle-ci, utilisée en monothérapie avec régime alimentaire et exercice physique, ne permet pas un contrôle adéquat de la glycémie

## Puissant sur la réduction de la glycémie

Une prise par jour

# Januvia®

sitagliptine 1 comprimé par jour

**JANUVIA® 100 mg, comprimés pelliculés. COMPOSITION (\*)** : Principe actif : 100 mg de sitagliptine sous forme de phosphate de sitagliptine monohydraté. Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre, croscarmellose sodique, stéarate de magnésium, fumarate de stéaryle sodique, alcool polyvinylique, macrogol 3350, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer rouge, oxyde de fer jaune. **INDICATIONS** : - Chez les patients diabétiques de type 2, Januvia est indiqué pour améliorer le contrôle de la glycémie : • En association à la metformine, lorsque celle-ci, utilisée en monothérapie avec régime alimentaire et exercice physique, ne permet pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. • En association à un sulfamide hypoglycémiant, lorsque celui-ci, utilisé en monothérapie, à la dose maximale tolérée, avec régime alimentaire et exercice physique, ne permet pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie et lorsque la metformine est contre-indiquée ou n'est pas tolérée. • En association à un sulfamide hypoglycémiant et à la metformine, lorsqu'une bithérapie avec ces deux médicaments avec régime alimentaire et exercice physique ne permet pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. - Chez les patients diabétiques de type 2 pour lesquels l'utilisation d'un agoniste des récepteurs PPAR $\gamma$  (thiazolidinedione) est appropriée, Januvia est indiqué : • En association à cet agoniste des récepteurs PPAR $\gamma$ , lorsque celui-ci, utilisé en monothérapie avec régime alimentaire et exercice physique, ne permet pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. **POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION (\*)** : 1 comprimé par jour. En association à un sulfamide hypoglycémiant, la posologie du sulfamide hypoglycémiant peut être réduite pour diminuer le risque d'hypoglycémie. • Insuffisants rénaux : pas d'adaptation posologique en cas d'insuffisance rénale légère ; non recommandé en cas d'insuffisance rénale modérée ou sévère. • Insuffisants hépatiques : pas d'adaptation posologique en cas d'insuffisance hépatique légère à modérée. • Sujets âgés : pas d'adaptation posologique ; prudence chez les patients  $\geq$  75 ans. • Enfants : non recommandé en dessous de 18 ans. C.T.J. : 1,79 €. **CONTRE-INDICATION** : Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients (voir rubriques « Mises en garde et Précautions d'emploi » et « Effets indésirables »). **MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI (\*)** : • Ne pas utiliser chez les patients diabétiques de type 1 ou pour le traitement de l'acidocétose diabétique. • Incidence des hypoglycémies observées avec la sitagliptine en monothérapie ou en association avec la metformine ou la pioglitazone, au cours des essais cliniques, similaire au placebo. • Incidence des hypoglycémies observées avec la sitagliptine ajoutée à un sulfamide hypoglycémiant, au cours des essais cliniques, supérieure au placebo. • Ne pas utiliser en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère. • Cas graves de réactions d'hypersensibilité : arrêter le traitement. **INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTION (\*)** : • Effets d'autres médicaments sur la sitagliptine : Faible risque d'interactions cliniquement significatives. • Effets de la sitagliptine sur d'autres médicaments : Faible capacité à provoquer des interactions avec les substrats du CYP3A4, du CYP2C8, du CYP2C9 et du système de transport cationique organique (OCT). Surveiller les patients à risque de toxicité de la digoxine. **GROSSESSE ET ALLAITEMENT (\*)** : Ne pas utiliser. **CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DES MACHINES (\*)**. **EFFETS INDESIRABLES (\*)** : • Effets indésirables considérés comme imputables au médicament et rapportés au cours des essais cliniques : 1. en association à la metformine : Fréquents : nausées. Peu fréquents : somnolence, diarrhée, douleur abdominale haute, baisse de la glycémie, anorexie, réduction du poids. 2. en association à un sulfamide hypoglycémiant : Très fréquents : hypoglycémie. 3. en association à un sulfamide hypoglycémiant + metformine : Très fréquents : hypoglycémie. Fréquents : constipation. 4. en association à la pioglitazone (PPAR $\gamma$ ) : Fréquents : hypoglycémie, flatulence, œdème périphérique. 5. en monothérapie : céphalées, hypoglycémie, constipation et étourdissements. • Effets indésirables rapportés plus fréquemment pour Januvia au cours des essais cliniques, indépendamment de la relation de cause à effet : infections des voies respiratoires supérieures, rhinopharyngites, arthrose, douleurs des extrémités. • Effets indésirables rapportés depuis la commercialisation (fréquence non connue) : réactions d'hypersensibilité incluant anaphylaxie, angio-œdème, rash, urticaire et lésions cutanées exfoliatives y compris syndrome de Stevens-Johnson. **SURDOSAGE (\*)**. **PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES (\*)** : Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteur de la DPP-4, code ATC : A10BH01. **DONNEES ADMINISTRATIVES** : • Liste I. • A.M.M. EU/1/07/383/014 - Code CIP n° 379 250-4 : boîte de 28 cps (21.03.07, rév. 26.02.08) - Prix : 49,99 € - Remb. Séc. Soc. 65 % dans la seule indication : « chez les patients diabétiques de type 2, pour améliorer le contrôle de la glycémie, en association à la metformine, lorsque régime alimentaire, exercice physique et metformine ne permettent pas d'obtenir un contrôle adéquat de la glycémie. » • A.M.M. EU/1/07/383/018 - Code CIP n° 570 745-4 : boîte de 50 cps (21.03.07, rév. 26.02.08) - Conditionnement exclusivement hospitalier. • Agréé Collect. • **REPRESENTANT LOCAL** : Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret - 3, avenue Hoche - 75114 Paris cedex 08 - Tél. 01 47 54 87 00 - Centre d'Information : Tél. 01 47 54 88 00. (\*) Pour une information complète, consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit. © Marque déposée de Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., USA.



la médecine fondée sur les preuves.

Plus de 15 experts présenteront :  
**« LES ÉVÉNEMENTS DE L'ANNÉE EN DIABÉTOLOGIE »**

**Vendredi 9 Janvier 2009 - Palais de Congrès - Paris**

**EN VOUS INSCRIVANT AUX ÉVÈNEMENTS DE L'ANNÉE EN «DIABÉTOLOGIE»,  
 VOUS POURREZ ASSISTER AUX AUTRES MANIFESTATIONS  
 QUI SE DÉROULERONT EN MÊME TEMPS AU PALAIS DES CONGRÈS.**



**BULLETIN D'INSCRIPTION**

**DIABÉTOLOGIE 2009**

**9 Janvier 2009**

**Palais des Congrès - Porte Maillot - 75017 Paris**

**Métro : Porte Maillot**

Nom et Prénom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : ..... Pays : .....

Tél. : ..... Fax : .....

	Prix	Quantité	Total
<b>Congressiste inscrit avant le 30/11/08</b>	<b>100 €</b>	.....	.....
<b>Congressiste inscrit après le 30/11/08</b>	<b>120 €</b>	.....	.....
<b>Interne et Chefs de clinique (hors soirée)</b>	<b>50 €</b>	.....	.....
• Soirée du Congrès (9 janvier)	80 €	.....	.....
• Soirée du Congrès - Accompagnant	80 €	.....	.....
• Déjeuner du Vendredi 9 janvier	35 €	.....	.....
• Déjeuner du Samedi 10 janvier	35 €	.....	.....
<b>TOTAL</b>		.....	.....

**Paiement** : Je joins la somme de : ..... €



Sur présentation de ce document original auprès d'un point de ventes Air France ou agréé en France, vous obtiendrez jusqu'à 50 % de réduction dans la limite des places disponibles pour l'achat d'un billet aller/retour sur le réseau métropole Air France pour vous rendre à la manifestation.

*Renseignements, réservation et envoi des billets à domicile en France :*  
 Tél. : 0 820 820 820 (0.12 €/mn)  
 ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

AGRÈMENT MÉTROPOLE AIR FRANCE.  
 Validité : deux jours avant et après le Congrès.  
 A l'étranger, contactez le central de réservation Air France de votre pays.

**TRANSPORTS** : Fiches de réduction « Congrès » sur le réseau FRANCE :

SNCF : oui  non   
 AIR-FRANCE agrément : 05475AF oui  non

**NB : Les conférenciers sont tenus impérativement de s'inscrire**

chèque  
 virement : BNP Champs Elysées, 37, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris - France  
 A l'ordre de CFEE - Compte N° 30004.00804.00010140052.36  
 Code IBAN : FR76 3000 4008 0400 0101 4005 236

carte de crédit :  visa  mastercard

Date d'expiration :

Carte N°

Date : Signature :

**A retourner accompagné de votre règlement à l'ordre de : CFEE**

**INFORMATION ET INSCRIPTION : CFEE / DIABÉTOLOGIE 2009**

**Contact : Jean-Claude LEFRANC**

**12, rue du Quatre Septembre - 75002 Paris - France**

**Tél. : 33 (1) 42 86 55 73 - Fax : 33 (1) 42 60 45 35 - <http://www.eska.fr>**