

# XI<sup>es</sup> JOURNÉES DE Sénologie Interactive 2008

DEUXIÈME ANNONCE

SÉNOLOGIE  
INTERACTIVE

euro  
cancer  
2008

FORUM SEIN

PARIS 2008

Judi 25 septembre  
&  
Vendredi 26 septembre 2008

XI<sup>es</sup> Journées de  
l'Hôpital Saint-Louis

*LIEU DU CONGRÈS : Cercle Républicain  
5, avenue de l'Opéra - 75001 Paris*

*Président d'honneur : Carlos FREIRE DE OLIVEIRA*

**ORGANISÉES PAR MARC ESPIÉ ET ANDRÉ GORINS**

SECRÉTARIAT SCIENTIFIQUE : DR MARC ESPIÉ (SERVICE ONCOLOGIE ET DES MALADIES DU SEIN)  
HÔPITAL SAINT-LOUIS - 1, AVENUE CLAUDE VELLEFAUX 75010 PARIS - TÉL. : 01 42 49 92 93

Renseignements et Inscriptions : CFEE - 12, rue du Quatre-Septembre 75002 Paris - France  
Tél. : +33 (1) 42 86 55 86 - Fax : +33 (1) 1 42 60 45 35 - Email : [congres@eska.fr](mailto:congres@eska.fr) <http://www.eska.fr>

# XI<sup>ES</sup> JOURNÉES DE SÉNOLOGIE INTER

Lieu du congrès : Cercle Républicain

**DEUXIÈME ANNONCE**

## JOURNÉES PRÉSIDÉES par André

### Jeudi 25 Septembre 2008

<b>8h30</b>	<b>ACCUEIL – RETRAIT DES DOSSIERS – CAFÉ</b>
<b>9h00 - 9h15</b>	<b>INTRODUCTION</b>
<b>9h15 - 10h30</b>	<b>CAS CLINIQUES - SYSTÈME INTERACTIF - avec le soutien de ASTRAZENECA</b> Présentation de cas cliniques - Avis des Experts et du Public
<b>10h30 - 11h00</b>	<b>PAUSE - VISITE DES STANDS</b>
<b>11h00 - 11h30</b>	<b>CONFERENCE DU PRESIDENT D'HONNEUR .....Carlos FREIRE DE OLIVEIRA</b>
<b>11h30 - 12h00</b>	<b>ACTUALITÉS - Les récents congrès</b> et les nouveautés en sénologie..... Sylvie GIACCHETTI et Caroline CUVIER
<b>12h00 - 12h30</b>	<b>DEBAT – Mise en évidence et signification des micro-métastases ganglionnaires</b> dans le cancer du sein ..... Anne de ROQUANCOURT, Laurence CAHEN-DOIDY et André GORINS
<b>12H30 - 13H30</b>	<b>SYMPOSIUM JANSSEN-CILAG</b>
	Actualité de la prise en charge de la douleur..... Brigitte GEORGES
	Actualité de la prise en charge de l'anémie..... Florian SCOTTE
<b>13h30 - 14h30</b>	<b>DÉJEUNER BUFFET</b>
<b>14h30 - 16h30</b>	<b>ATELIERS DE TRAVAIL - FORMATION SAINT-LOUIS - RESEAU SEIN</b>
	• Les traitements locorégionaux des cancers du sein (chirurgie-radiothérapie) en pratique, gestion des suites et des effets indésirables, reconstruction mammaire .....Edwige BOURSTYN, Laurence CAHEN-DOIDY, Jean MASSON, Claude MAYLIN et Guillaume SERGENT
	• Hormones et sein, grossesse et contraception après cancer du sein ..... André GORINS, Sylvie BONFILS, Marc ESPIE et Bertrand TOURNANT,
	• Sein et psychisme, sexualité et qualité de vie après cancer du sein ..... Dominique DELFIEU, Natacha ESPIE, Nathalie GIRARD, Kheira MEBRACK, Vanessa PERSICOT, Claude SMADJA et Diane WINAVER
	• Imagerie en sénologie.....Marcela ALBITER, Cédric de BANZELAIRE, Franck COHEN-SCALI, Jean-Yves SEROR, Mickael SUISSA et Caroline CUVIER
	• Chimiothérapie et hormonothérapie en traitement adjuvant des cancers du sein .....Naïma BEDAIRIA, Sylvie GIACCHETTI, Hamid HOCINI et Patrick CHARVERIAT
<b>16h30 - 17h00</b>	<b>PAUSE – VISITE DES STANDS</b>
<b>17h00 - 17h30</b>	<b>Le sein sexuel..... Michèle LACHOWSKY</b>
<b>17h30 - 18h00</b>	<b>Thyroïde et Sein. .... Philippe TOURAINÉ</b>

# ACTIVITE DE L'HÔPITAL SAINT-LOUIS - 2008

- 5 avenue de l'Opéra - 75001 Paris

**GORINS et Marc ESPIÉ**



**Vendredi 26 Septembre 2008**

<b>8h30</b>	<b>ACCUEIL, CAFÉ</b>
<b>9h00 - 9h30</b>	Indications actuelles du Pet Scan en sénologie..... Jean-Luc MORETTI
<b>9h30 - 10h00</b>	Conservation de la fertilité chez les femmes ayant un cancer du sein. .... Catherine POIROT
<b>10h00 - 10h30</b>	Thérapeutiques ciblées et cancer du sein..... Marc ESPIE <i>avec le soutien du GLAXOSMITHKLINE</i>
<b>10h30 - 11h00</b>	<b>PAUSE - VISITE DES STANDS</b>
<b>11h00 - 11h30</b>	Syndrome prémenstruel mammaire ..... Henri ROZENBAUM Conception actuelle et attitude thérapeutique Que faire et ne pas faire ?
<b>11h30 - 12h15</b>	<b>DEBAT - Traitement des métastases osseuses du cancer du sein :</b> Place des bisphosphonates, de la radiothérapie, de la chirurgie et de la cimentoplastie..... Sylvie GIACCHETTI, Jacques CHIRAS et Claude MAYLIN
<b>12h15 - 12h45</b>	Que penser des scores de risque de cancer du sein ? Conduite à tenir..... Odile COHEN-HAGUENAUER et Edwige BOURSTYN
<b>12h45 - 13h15</b>	Premiers résultats du protocole REMAGUS (Chimio néo adjuvante du cancer du sein)..... Michel MARTY
<b>13h15- 13h45</b>	<b>SESSION MISSION</b> ..... Marc ESPIE
<b>13h45 - 14h30</b>	<b>DÉJEUNER BUFFET</b>
<b>14h30 - 15h00</b>	Abcès du Sein - Mastites Inflammatoires. .... Bertrand TOURNANT
<b>15h00 - 15h30</b>	Attitude chirurgicale dans le cancer du sein inflammatoire ..... Khaled RAHAL
<b>15h30 - 16h00</b>	Les rechutes locales après traitement conservateur du cancer du sein..... Edwige BOURSTYN, Caroline CUVIER et Claude MAYLIN
<b>16h00</b>	<b>CONCLUSION DES JOURNEES</b>
	<b>REMISE DES PRIX</b>
	- SUIVEZ LE SEIN
	- LE MEILLEUR DESSIN DES SEINS
<b>20h00 - 23h00</b>	<b>SOIRÉE DU CONGRÈS - 26 Septembre 2008 (sur réservation)</b>

NÉPHROLOGIE • ONCOLOGIE-HÉMATOLOGIE • CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE


**Eprex**<sup>®</sup>  
époétine alfa

**NOUVEAU**

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ D'AIGUILLE



Mettez votre sécurité  
sous contrôle



Boz. 0B/08/03/EPR/APR/MLR EPR Tous dosages 02.08A

Médicament d'exception. À utiliser conformément  
à la fiche d'information thérapeutique.



JANSSEN-CILAG

**EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml. solution injectable en seringue préremplie Epoétine alfa FORMES ET PRESENTATIONS\* :** EPREX®, solution injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d'aiguille (en caoutchouc recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d'aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue : Eprex® 2 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6. Eprex® 4 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6. Eprex® 10 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,3 ml (3 000 UI) ; 0,4 ml (4 000 UI) ; 0,5 ml (5 000 UI) ; 0,6 ml (6 000 UI) ; 0,8 ml (8 000 UI) et 1 ml (10 000 UI), boîtes de 6. Eprex® 40 000 UI/ml : seringue préremplie de 0,5 ml (20 000 UI) et 1 ml (40 000 UI), boîtes de 1. Solution injectable, transparente, incolore. **COMPOSITION\*** : Epoétine alfa. Excipients à effet notoire (présents dans ce produit à une concentration < 1 mmole) : phosphate monosodique dihydraté, phosphate disodique dihydraté, chlorure de sodium. **INDICATIONS THERAPEUTIQUES :**

**EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies :** - Traitement de l'anémie secondaire à une insuffisance rénale chronique chez les enfants et les patients adultes hémodialysés et les patients adultes en dialyse péritonéale. - Traitement de l'anémie sévère d'origine rénale accompagnée de symptômes cliniques chez les patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés. **EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies :** - Traitement de l'anémie et réduction des besoins transfusionnels chez les patients adultes traités par chimiothérapie pour des tumeurs solides, des lymphomes malins ou des myélomes multiples et à risque de transfusion en raison de leur état général (par exemple état cardiovasculaire, anémie pré/existante au début de la chimiothérapie). - EPREX® peut être utilisé pour augmenter les dons de sang autologue chez des malades participant à un programme de transfusions autologues différées. L'utilisation dans cette indication doit tenir compte du risque accru d'accidents thromboemboliques. Le traitement est indiqué chez les malades présentant une anémie modérée (Hb : 10-13g/dl soit 6,21 - 8,07 mmol/l) et sans carence martiale s'il n'existe pas ou peu de méthodes d'épargne du sang lorsqu'une intervention chirurgicale programmée importante nécessite de grandes quantités de sang (4 unités de sang ou plus chez les femmes et 5 unités de sang ou plus chez les hommes). - EPREX® peut être utilisé pour réduire l'exposition aux transfusions de sang homologue chez les patients adultes, sans carence martiale, devant subir une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée, ayant un risque présumé important de complications transfusionnelles. L'utilisation devra être réservée aux patients ayant une anémie modérée (par exemple Hb : 10-13 g/dl) qui n'ont pas accès à un programme de prélèvement autologue différé et chez lesquels on s'attend à des pertes de sang modérées (900 à 1800 ml). *Les Bonnes Pratiques de gestion du sang doivent toujours être appliquées dans le contexte chirurgical.* **POSOLOGIE**

**ET MODE D'ADMINISTRATION\* :** *Mode d'emploi\**. **Patients en insuffisance rénale chronique\*** (EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml). Patients Adultes en hémodialyse\* ; enfants en hémodialyse\* ; patients adultes insuffisants rénaux non encore dialysés\* ; patients adultes en dialyse péritonéale\*. **Patients cancéreux adultes présentant une anémie symptomatique et recevant une chimiothérapie\***. **Patients adultes en chirurgie participant à un programme de prélèvements autologues différés\***. **Patients adultes devant bénéficier d'une chirurgie orthopédique majeure programmée\***. **CONTRE-INDICATIONS :** Les patients ayant développé une érythroblastopénie à la suite d'un traitement par une érythropoïétine ne doivent pas être traités par EPREX® ou par toute autre érythropoïétine (cf. paragraphe « Mises en garde spéciales et précautions particulières d'emploi » - Erythroblastopénie). Hypertension non contrôlée. Toutes les contre-indications associées à un programme de prélèvement autologue différé doivent être respectées chez les patients qui reçoivent époétine alfa au cours d'un tel programme. Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. L'utilisation d'époétine alfa, chez les patients devant bénéficier d'une intervention chirurgicale orthopédique majeure programmée et ne participant pas à un programme de prélèvement autologue différé, est contre-indiquée : - chez les patients présentant une pathologie vasculaire sévère coronarienne, carotidienne, des artères périphériques, ou cérébrale, y compris chez les patients présentant des antécédents récents d'infarctus du myocarde ou d'accident vasculaire cérébral. - chez les patients qui, quel qu'en soit la raison, ne peuvent pas recevoir une prophylaxie antithrombotique appropriée. **MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI\* :**

**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES FORMES D'INTERACTION\* :** **GROSSESSE ET ALLAITEMENT\* :** Chez l'insuffisant rénal chronique, l'époétine alfa ne doit être utilisée en cas de grossesse que si le bénéfice escompté justifie le risque potentiel pour le fœtus. L'utilisation d'époétine alfa n'est pas recommandé chez les patientes enceintes ou allaitant, participant à un programme de prélèvement autologue différé avant chirurgie. **EFFETS INDESIRABLES\* :** **SURDOSAGE\* :** **PHARMACODYNAMIE\* :** Classification ATC : B03XA01 - AUTRES ANTI-ANEMIQUES/ERYTHROPOIETINE (B : sang et organes hématopoïétiques). **PHARMACOCINETIQUE\* :** **DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES\* :** **INCOMPATIBILITES :** En l'absence d'étude de compatibilité ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments. **PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :** A conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ces limites de température doivent être strictement respectées jusqu'à l'administration au patient. A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Ne pas congeler. Ne pas agiter. **PRECAUTIONS PARTICULIERES**

**D'ELIMINATION ET DE MANIPULATION :** Ne pas administrer par perfusion intraveineuse ni en mélange avec d'autres produits en solution. Avant utilisation, laisser reposer la seringue d'EPREX® jusqu'à ce qu'elle atteigne la température ambiante. Ceci prend habituellement 15 à 30 minutes. Ce produit ne doit pas être utilisé, et doit être éliminé : Si le scellage est endommagé, Si le liquide est coloré ou si vous pouvez voir des particules en suspension, Si vous savez ou pensez que le produit a été accidentellement congelé, Si vous savez ou suspectez que le produit a été laissé plus de 60 minutes à température ambiante avant l'injection ou, S'il y a eu une panne du réfrigérateur. Ce produit est à usage unique seulement. Utiliser une seule dose d'EPREX® de chaque seringue en éliminant la quantité de solution non désirée avant l'injection. Voir la rubrique 3. Comment utiliser EPREX® (instructions pour l'utilisation d'EPREX®) de la notice. Les seringues préremplies sont équipées d'un dispositif de sécurité de l'aiguille afin d'éviter les piqûres accidentelles après injection. La notice contient les instructions complètes d'utilisation et de manipulation des seringues préremplies. Tout produit non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE :** Liste I. Prescription initiale hospitalière d'une durée de un an. EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml et 10 000 UI/ml solution injectable en seringues préremplies : La prescription initiale par un médecin exerçant dans un service de dialyse à domicile est également autorisée. **A.M.M.** (EPREX® 2 000 UI/ml, 4 000 UI/ml, 10 000 UI/ml et 40 000 UI/ml solution injectable en seringue préremplie : rev. 02.2008) / **PRIX.** Agréé coll. - remb Séc Soc à 65% selon la procédure de médicament d'exception (prescription sur une ordonnance de médicament d'exception dans le respect des mentions de la fiche d'information thérapeutique). Inscrit sur la liste des spécialités prises en charge en sus de la T2A. **EPREX®, solution**

**injectable en seringue préremplie (verre type I) avec un piston (recouvert de téflon) et aiguille avec un capuchon protecteur d'aiguille (en caoutchouc recouvert de polypropylène) et un dispositif de sécurité d'aiguille (copolyester et polycarbonate) attaché à la seringue.** Eprex® 2 000 UI/ml : 364 666.5 : seringue préremplie de 0,5 ml (1 000 UI), boîte de 6 : 61,81 €. Eprex® 4 000 UI/ml : 364 667.1 : seringue préremplie de 0,5 ml (2 000 UI), boîte de 6 : 118,39 €. Eprex® 10 000 UI/ml : 364 668.8 : seringues préremplies de 0,3 ml (3 000 UI), boîte de 6 : 174,98 €. 364 669.4 : seringues préremplies de 0,4 ml (4 000 UI), boîte de 6 : 228,20 €. 354 970.3 : seringues préremplies de 0,5 ml (5 000 UI), boîte de 6 : 280,89 €. 354 972.6 : seringues préremplies de 0,6 ml (6 000 UI), boîte de 6 : 333,57 €. 354 974.9 : seringues préremplies de 0,8 ml (8 000 UI), boîte de 6 : 438,93 €. 349 312.1 : seringues préremplies de 1 ml (10 000 UI), boîte de 6 : 542,71 €. Eprex® 40 000 UI/ml : 369 919-9 : seringue préremplie de 0,5ml (20 000UI), boîte de 1 : 193,08 €. 369 923-6 : seringue préremplie de 1 ml (40 000UI), boîte de 1 : 368,69 €. **TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE :** JANSSEN-CILAG - 1, rue Camille Desmoulins - TSA 91003 - 92787 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Information Médicale et Pharmacovigilance. Tél. (n° vert) : 0800 1 40 000. E-mail : medisource@jinfr.jnj.com. **\*Pour une information complète se reporter au dictionnaire des spécialités VIDAL.**

# XI<sup>ES</sup> JOURNÉES DE SÉNOLOGIE INTERACTIVE DE L'HÔPITAL SAINT-LOUIS - 2008

25 & 26 Septembre 2008 - Lieu du congrès : Cercle Républicain - 5, avenue de l'Opéra - 75001 Paris

## A. DROITS D'INSCRIPTION :

- |  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | avant le 14.07.2008            | après le 15.07.2008            |
| - Médecin  | <input type="checkbox"/> 120 € | <input type="checkbox"/> 160 € |
| - Sage femme, infirmière, technicien   |                                |                                |
| Chef de clinique (joindre un justificatif)   | <input type="checkbox"/> 60 €  | <input type="checkbox"/> 80 €  |
| - Interne (joindre un justificatif)  | <input type="checkbox"/> 30 €  | <input type="checkbox"/> 40 €  |
| <input type="checkbox"/> <b>ABONNÉS à la revue REPRODUCTION HUMAINE ET HORMONES*</b> |                                |                                |
| *Entrée gratuite (hors déjeuners), préciser votre numéro d'abonné : n°.....          |                                |                                |

Choisissez votre forfait dans la grille ci-dessous : (cochez vos choix et indiquez le montant total dans la case 2)

Forfait	Hôtel	Congressiste (1 nuit)	Congressiste (2 nuits)	Nuit supplémentaire par personne en chambre double
F1	Hôtel **	<input type="checkbox"/> 120 €	<input type="checkbox"/> 240 €	<input type="checkbox"/> 60 €
F2	Hôtel ***	<input type="checkbox"/> 160 €	<input type="checkbox"/> 320 €	<input type="checkbox"/> 100 €
F3	Hôtel ****	<input type="checkbox"/> 200 €	<input type="checkbox"/> 400 €	<input type="checkbox"/> 150 €

Prix valables jusqu'au 30 juillet 2008, au-delà une majoration de 10% du prix indiqué sera appliquée

## B. TRANSPORT :

Fiches de réduction :  SNCF  AIR FRANCE - Réf. : 02367AF

## C. DÉJEUNERS : Préciser les jours (pour abonnés et invités)

- Jeudi 25.09.2008 Nbr ..... x 35 € = ..... €
- Vendredi 26.09.2008 Nbr ..... x 35 € = ..... €

Total Déjeuners

## D. SOIRÉE DU CONGRÈS :

Soirée du Congrès :  
Vendredi 26 septembre 2008 : 20h00 - 23h00

80 €  80 € (Accompagnant)

Total Soirée du Congrès

SOUS-TOTAL ① + ② + ③ + ④ = ⑤

## E. JE SOUHAITE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE ANNULATION :

OUI  NON

## F. MONTANT TOTAL TTC A RÉGLER :

Carte bancaire  Chèque  Espèce N° .....

Carte de crédit :  VISA  Mastercard Date d'expiration /\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TOTAL ⑤ + ⑥ = ⑦

## G. MES COORDONNÉES :

Écrire en lettres capitales d'imprimerie SVP

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_ Pays : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

Nom et Prénom de l'accompagnant non congressiste : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_ Signature : \_\_\_\_\_

À retourner accompagné de votre règlement à l'ordre de : CFEE - 12, rue du Quatre-Septembre 75002 Paris - France  
Tél. : +33 (1) 42 86 55 86 - Fax : +33 (1) 1 42 60 45 35 - Email : congres@eska.fr <http://www.eska.fr>

①

Total Inscription

②

Total Nuits d'Hôtel

③

Total Déjeuners

④

Total Soirée du Congrès

⑤

⑥

⑦